Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

AVIS Comunale Caspoggio
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

CAUSE DI NON IDONEITÀ ALLA DONAZIONE

Vengono applicati i criteri di sospensione temporanea e/o permanente aggiornati secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 02 novembre 2015:"Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti"

SINTOMI	IDONEITA'
Neoplasie maligne	Non idonei
Malattie autoimmuni	Non idonei se la malattia autoimmune coinvolge più organi
Malattia celiaca	Idonei se seguono una dieta priva di glutine
Malattie cardiovascolari	Non idonei in caso di malattia coronarica, portatori di stent aorto coronarici, aritmia grave, malattia cerebro vascolare, trombosi arteriosa o venosa ricorrente. Possono essere accettati i soggetti con anomalie congenite completamente guarite o corrette.
Ipertensione arteriosa	Idonei se in trattamento farmacologico con buon compenso e senza danno d'organo
Malattie organiche del SNC	Non idonei
Trapianto di organo solido, di CSE, di cornea, di sclera, di dura madre o xenotrapianto	Non idonei
Diatesi emorragiche e coagulopatie congenite o acquisite	Non idonei
Epilessia	Non idonei. Possono essere accettati i soggetti con pregresse convulsioni febbrili infantili
Diabete	Non idonei se in trattamento insulinico
Anafilassi	Non idonei
Manifestazioni allergiche gravi (soprattutto a penicillina, cefalosporine, veleno di imenotteri)	Sospensione per 2 mesi dopo l'ultima esposizione
Allergia stagionale	Sospensione nella fase acuta
Affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, respiratorie, metaboliche	Non idonei se croniche, recidivanti o con permanente danno d'organo. Negli altri casi sospensioni temporanea a discrezione del medico
Infezione da HBV (epatite B), HCV (epatite C), HIV(sieropositività/AIDS), Treponema Pallidum (sifilide)	Non idonei
Convivenza abituale o occasionale con soggetto con positività per HBsAg e/o anti-HCV	Sospensione per 4 mesi dopo la cessazione, della convivenza, anche se il soggetto è vaccinato per l'epatite B
Rapporti sessuali con partner positivo ai test per l'epatite B, l'epatite C o l'AIDS	Sospensione per 4 mesi dopo I ultimo rapporto
Comportamenti sessuali a rischio (etero, omo e bisessuali occasionali, rapporto con più partner, con tossicodipedenti, con scambio di denaro o droga)	Sospensione per 4 mesi dopo l'ultimo rapporto
Tubercolosi	Sospensione per 2 anni dopo la completa guarigione
Febbre reumatica	Sospensione per 2 anni dopo la cessazione dei sintomi e in assenza di cardiopatia cronica
Malattia di Lyme	Sospensione per 1 anno dopo la guarigione
Toxoplasmosi	Sospensione per 6 mesi dopo la completa guarigione
Mononucleosi Infettiva e infezione accertata da CMV	Sospensione per 6 mesi dopo la completa guarigione
Sindrome influenzale o febbre >38°C	Sospensione per 2 settimane dopo la completa guarigione
Virus del Nilo Occidentale (WNV)	I soggetti con diagnosi di infezione possono essere ammessi alla donazione dopo 4 mesi dalla risoluzione del quadro clinico. - I soggetti che hanno viaggiato in Paesi a rischio per infezione da WNV possono essere ammessi alla donazione dopo 28 giorni dal: rientro. La sospensione non si applica nel caso) in cui venga eseguito il test (stagione estivo- autunnale).

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

AVIS Comunale Caspoggio
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

SINTOMI	IDONEITA'
Malattia di Chagas o tripanosomiasi americana	Non idoneo in caso di test per anticorpi anti-Tripanosoma Cruzii positivo. - I soggetti nati, o con madre nata in Paesi dove la malattia è endemica (America Centrale e America Latina), se asintomatici, possono essere ammessi alla donazione solo con un test per anticorpi anti-Tripanosoma Cruzii negativo. - I soggetti che hanno viaggiato in Paesi dove la malattia è endemica (America Centrale e America Latina), possono essere ammessi alla donazione dopo 6 mesi dal rientro e solo con un test per anticorpi anti-Tripanosoma Cruzii negativo.
Malaria	- I soggetti che hanno sofferto di malaria durante un soggiorno in una zona endemica o nei 6 mesi dal rientro possono essere ammessi alla donazione dopo 6 mesi dalla risoluzione del quadro clinico e solo con un test per anticorpi anti malarici negativo. - I soggetti che hanno vissuto nell'arco della, loro vita per almeno 6 mesi in zona endemica possono essere ammessi alla donazione dopo 6 mesi dal rientro e solo con un test per anticorpi anti malarici negativo. - I soggetti che sofferto di malaria durante un soggiorno in zona endemica o nei 6 mesi dal rientro possono essere ammessi alla (donazione dopo 6 mesi dalla risoluzione delquadro clinico e solo con un test per anticorpi anti malarici negativo. - I soggetti che hanno visitato un'area endemica e che non hanno accusato alcuna sintomatologia, possono essere ammessi:- alla donazione di sangue o di plasma per uso clinico dopo 6 mesi dal rientro con un test per anticorpi anti malarici negativo o dopo 12 mesi senza l'esecuzione del test;- alla donazione di plasma per uso industriale 6 mesi dal rientro senza l'esecuzione del test.
Esame endoscopico con strumenti	Sospensione per 4 mesi dall'esecuzione dell'esame
Tatuaggi, piercing, foratura lobi agopuntura con dispositivi non monouso	Sospensione per 4 mesi dall'esecuzione
Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago	Sospensione per 4 mesi dall'evento
Trasfusione di emocomponenti o somministrazione di emoderivati (ad es: Ig anti-tetano, Ig anti-D)	Sospensione per 4 mesi dopo la trasfusione/somministrazione
Intervento chirurgico maggiore	Sospensione per 4 mesi dall'intervento e in condizioni di benessere
Intervento chirurgico minore (in regime ambulatoriale)	Sospensione per 1 settimana dopo la completa guarigione clinica
Cure odontoiatriche minori(otturazioni, pulizia)	Sospensione per 48 ore dopo l'esecuzione
Estrazioni dentarie non complicate, devitalizzazioni, implantologia	Sospensione per 1 settimana dopo la completa guarigione
Innesto di tessuto osseo autologo o omologo	Sospensione per 4 mesi dopo l'innesto
Gravidanza	Non idonea durante la gravidanza - Sospensione per 12 mesi dopo il parto - Sospensione per 6 mesi dopo l'interruzione di gravidanza
Farmaci	Sospensione per un periodo variabile a seconda del farmaco e/ o della malattia oggetto di cura - antistaminici/terapie desensibilizzanti (allergie): 72 ore dall'ultima somministrazione - antibiotici: 15 giorni dal termine della terapia - cortisonici: 15 giorni dal termine della terapia - antidolorifici/antinfiammatori: da 1 a 7 giorni a seconda della patologia - ansiolitico: nessuna sospensione - antipertensivo: nessuna sospensione con buon compenso dei valori pressori - anti-diabetici orali: nessuna sospensione con buon compenso dei, valori glicemici - eutirox: nessuna sospensione con buon compenso del TSH - anticoncezionali e terapie ormonali sostitutive: nessuna sospensione

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

AVIS Comunale Caspoggio
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

SINTOMI	IDONEITA'
VACCINAZIONI	
Vaccino dell'epatite B	7 giorni se asintomatico
Vaccino dell'epatite A	48 ore se asintomatico
Virus o batteri vivi attenuati (febbre gialla, tifo, TBC, rosolia, parotite, morbillo)	4 settimane se asintomatico
Tossoidi (tetano, difterite, pertosse) Virus, Batteri, rickettise inattivati/uccisi e vaccini ricombinanti (papilloma virus, influenza, poliomelite, varicella)	48 ore se asintomatico
VIAGGI	
EUROPA	Nessuna sospensione salvo in situazioni epidemiologiche particolari (focolai di malattia)
Regno Unito	Non idonei i soggetti che tra il 1980 e il 1996 hanno soggiornato per più di 6 mesi consecutivi hanno subito interventi chirurgici hanno ricevuto trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati
AMERICA DEL NORD	
Alaska	Nessuna sospensione
Canada, USA	28 giorni dall'ultimo giorno del soggiorno (WNV)
Messico	6 mesi dal rientro (Zika virus e m. di Chagas)
AMERICA CENTRALE Guatemala, El Salvador, Panama, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Caraibi	6 mesi dal rientro (Zika virus, M. di Chagas, Chikungunya)
AMERICA LATINA Brasile, Colombia, Suriname, Paraguay, Venezuela, Guyana, Ecuador, Bolivia, Peru', Argentina, Uruguay, Cile	6 mesi dal rientro (Zika virus, M. di Chagas, Chikungunya, malaria -Amazzonia)
NORD AFRICA Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco	Nessuna sospensione salvo in situazioni epidemiologiche particolari (focolai di malattia) e in assenza di sintomatologia
Capo Verde	28 giorni dal rientro (Zika virus)
AFRICA SUB SAHARIANA	6 mesi dal rientro (malattie tropicali, malaria)
Repubblica Sudafricana	Nessuna sospensione salvo in situazioni epidemiologiche particolari (focolai di malattia) e in assenza di sintomatologia
ASIA India, Nepal, Bangladesh, Cambogia, Vietnam, Laos, Filippine, Indonesia, Thailandia, Malaysia, Nuova Guinea	6 mesi dal rientro (malattie tropicali, malaria, Zika virus)
Maldive, Mauritius, La Reunion , Seychelles	28 giorni dal rientro (zika virus, Chikungunya)
ISOLE DEL PACIFICO	28 giorni dal rientro (Zika virus)
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA	Nessuna sospensione salvo in situazioni epidemiologiche particolari (focolai di malattia) e in assenza di sintomatologia